

Tratamiento con propóleos del Condiloma acuminado

Teresa Giral*, V. Menéndez**, M. A. Lopez** y M. Ruíz*

MSc. Dra. Teresa Giral, Investigador Auxiliar

Dr. Vicente Menéndez, Especialista de 1er grado en Dermatología.

Dr. Miguel A. López, Especialista en Dermatología.

Miguel Ruíz, Técnico.

Estación Experimental Apícola *

Hospital Docente { Salvador Allende| **

Resumen

Se informa la experiencia obtenida en el tratamiento de Condiloma acuminado, con extracto alcohólico de propóleos al 5 % en forma tópica en pacientes masculinos. Los resultados positivos observados permiten recomendar este tratamiento para esta enfermedad de transmisión sexual.

Introducción

Numerosos autores se han referido a las diversas propiedades que posee el propóleos y a su acción antiviral, dentro de los que se puede citar los trabajos de Juliana de Crison et al, (1976), Jucut et al, (1976), Filipic y Likar (1978) y recientemente el realizado en 1988 por Zujay et al; en el Hospital Materno Infantil de 10 de Octubre, en el tratamiento de esta enfermedad de origen viral y transmisión sexual.

El objetivo del presente trabajo fue comprobar la efectividad del tratamiento del condiloma acuminado con extracto hidroalcohólico de propóleos en concentración de sólidos solubles del 5 % en pacientes masculinos, aplicado en forma tópica.

Materiales y Métodos

Se utilizó extracto hidroalcohólico de propóleos en concentración de sólidos solubles del 5 % preparados en la Estación Experimental Apícola, en aplicación tópica dos veces al día por un período de 10 días, sin realizar lavado posterior de la zona afectada.

Se trataron 28 pacientes con extracto hidroalcohólico de propóleos al 5 % y 28 pacientes recibieron otros tratamientos (controles), a quienes se les suministraron los siguientes medicamentos: 15 pacientes fueron tratados con podofilina una vez semanal, cuatro pacientes tratados con electrodesecación aplicado una vez semanal y nueve pacientes con tricloroacético una vez semanal.

Resultados y Discusión

Después de cinco a siete días de tratamiento con extracto hidroalcohólico de propóleos al 5 % fueron observados el comienzo de la caída de las verrugas, lo que demuestra un efecto superior a los tratamientos convencionales.

Los resultados de los pacientes tratados con extracto hidroalcohólico de propóleos al 5 % y los tratamientos habituales se muestran en las Tablas #1 y #2 puede constatar el porcentaje de efectividad del propóleos, respecto a los otros tratamientos (Tabla #3), el

cual resultó más eficaz debido a la rápida respuesta y la pronta recuperación de los pacientes sin observarse efectos indeseables, no se manifestó en los pacientes la ardencia ni las molestias presentes en los tratamientos habituales.

Se observaron recidivas en un grupo de pacientes (cuatro pacientes), lo que ocurre también con los otros tratamientos antes citados.

Al igual que Zujay (1989), se utilizó el extracto hidroalcohólico de propóleos al 5 % y se comprobó que resulta efectivo en el tratamiento de pacientes masculinos, sin la presencia de alergia al propóleos.

Conclusiones

1. El extracto hidroalcohólico de propóleos en concentración de sólidos solubles 5 % utilizado en forma tópica, constituye un preparado a tener en cuenta en el tratamiento de afecciones dérmicas de transmisión sexual.
2. Es de fácil administración sin presentar efectos indeseables en los pacientes.
3. No se presentaron fenómenos de alergias al producto en ninguno de los pacientes tratados.
4. Se comprobó la efectividad del extracto hidroalcohólico de propóleos de sólidos solubles del 5 %, en forma tópica en el tratamiento del condiloma acuminado en pacientes masculinos.

Bibliografía

Feikf, K. A/ Aplicación local de un extracto de propóleos en el tratamiento de la Zona Zoster. En: III Sposium International D' Apitherapic.. Bucarest: Ed. Apimondia, -- p. 109-110.

Filipc, B.y M. Likar. a/ valor clínico de la Jalea Real y el propóleos contra las infecciones vírales. En: Nuevas Investigaciones en la Apiterapia.

Jucut, V., Gidoiu t., Sodica Babii y E. Palos. A/ Investigaciones acerca de la acción del propóleos y pan de abejas en la infección gripal experimental. En: Nuevas Investigaciones en la Apiterapia. Bucarest Ed. Apimondia, 1976. – p. 193-196.

Juliana Crison, Mutiu, Sah-Nazarov N., Cioca V., Esanu V. Y Aadexandra Popescu. Acción del propóleo en el virus herpético in vitro. En: Nuevas Investigaciones en la Apiterapia. Bucarest: Ed. Apimondia, 1976. – p. 196-202.

Zujay et al. Aplicación del propóleos en el condiloma acuminado. . En: Investigaciones Cubanas sobre el propóleos Matanza: Consejo Científico IMV, 1988 ó 1989 -- p. 234-236.

Tabla #1 a/ Pacientes bajo tratamiento con propóleos.

RESULTADOS OBTENIDOS:	
Buenos:	16
Regulares	5
Malos	7
Recidiva	4


Tabla #2. Resultados de pacientes bajo tratamientos habituales

No. de Pacientes	Tratamientos	Resultados Obtenidos			
		B	R	M	R
15	Podofilina	8	4	3	3
4	Electrodesecación	2	2		
9	Tricloroacético	3	6		

Tabla #3. A/ Comparación del porcentaje de efectividad entre tratamientos.

Tipos de tratamientos	Porcientos de buenos resultados
Propóleos	57
Podofilina	53
Electrodesección	50
Tricloroacético	33

Fig. 1: Resultados del tratamiento con propóleos del Condiloma acuminado



TREATMENT WITH PROPOLIS OF CONDILOMS

The experience of the employ of ethanol extract of propolis to 5 % of soluble solids, in topic form for the treatment of venereal papiloms in masculine patients was described . The permits recomendad this treatment for this sexual disease.

Fig. 2: Resultados de pacientes bajo Tratamientos habituales




Fig. 3: Comparación del % de efectividad entre tratamientos.

